

# 江西省发电

发电单位 省新冠指办

签批盖章王水平  
省新冠指办

等级 特提·明电 赣新冠指办明电〔2020〕117号 赣机发 号  



## 关于印发江西省公众科学戴口罩指引的通知

各设区市、赣江新区、县（市、区）新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部，省疫情防控指挥部各成员单位，前方指挥部：

目前，我省疫情防控形势呈现出持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。为指引普通公众、特定场所人员、重点人员以及职业暴露人员在不同场景下科学佩戴口罩，依据《国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制关于印发公众科学戴口罩指引的通知》（联防联控机制发〔2020〕33号），

我们组织编制了《江西省公众科学戴口罩指引》。现印发给你们，请参照执行。

附件：江西省公众科学戴口罩指引



省新型冠状病毒感染的肺炎疫情  
防控应急指挥部办公室

2020年3月19日

## 附件

# 江西省公众科学戴口罩指引

科学戴口罩，对于新冠肺炎、流感等呼吸道传染病具有预防作用，既保护自己，又有益于公众健康。目前，在抗击新冠肺炎疫情形势下，为引导公众科学戴口罩，有效防控疫情，保护公众健康，特提出以下指引。

## 一、普通公众

(一) 居家、户外，无人员聚集、通风良好。主要包含以下几种情形：

1. 个人独处(家庭、办公室、实验室、库房、开车等);
2. 在室外空旷且人员稀少地区(与他人相距1米以上)，或无人员聚集时的户外活动(如走路、散步、骑车等)、户外锻炼等;
3. 办公室人员固定，通风良好，相互间距离1米以上，人均占有面积不少于1平方米，且办公室人员无发热、干咳等症状;
4. 在农田地头、森林滩涂等人员不密集的户外劳动时;
5. 除行业特殊要求外，在建筑工地、野外勘探、高空作业等户外人员不密集的地方作业时;
6. 居家且家庭成员无发热、咳嗽等异常症状时;

7. 和健康的家人、朋友一起乘坐私家车时；
8. 一岁以内的婴幼儿一般不能带口罩，容易引起窒息。

防护建议：不戴口罩。

(二) 处于人员密集场所，如办公、购物、餐厅、会议室、车间等；或乘坐厢式电梯、公共交通工具等。

防护建议：在中、低风险地区，应随身备用口罩（一次性使用医用口罩或医用外科口罩），在与其他人近距离接触（小于等于 1 米）时戴口罩。在高风险地区，戴一次性使用医用口罩。

(三) 对于咳嗽或打喷嚏等感冒症状者。

防护建议：戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

(四) 对于与居家隔离、出院康复人员共同生活的人员。

防护建议：戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

## 二、特定场所人员

(一) 处于人员密集的医院、汽车站、火车站、地铁站、机场、超市、餐馆、公共交通工具以及社区和单位进出口等场所。

防护建议：在中、低风险地区，工作人员戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。在高风险地区，工作人员戴医用外科口罩或符合 KN95/N95 及以上级别的防护口罩。

(二) 在监狱、养老院、福利院、精神卫生医疗机构，以及学校的教室、工地宿舍等人员密集场所。

**防护建议：**在中、低风险地区，日常应随身备用口罩（一次性使用医用口罩或医用外科口罩），在人员聚集或与其他人近距离接触（小于等于 1 米）时戴口罩。在高风险地区，工作人员戴医用外科口罩或符合 KN95/N95 及以上级别的防护口罩；其他人员戴一次性使用医用口罩。

### **三、重点人员**

新型冠状病毒肺炎疑似病例、确诊病例和无症状感染者；新型冠状病毒肺炎密切接触者；入境人员（从入境开始到隔离结束）。

**防护建议：**戴医用外科口罩或无呼气阀符合 KN95/N95 及以上级别的防护口罩。

### **四、职业暴露人员**

**（一）普通门诊、病房等医务人员；低风险地区医疗机构急诊医务人员；从事疫情防控相关的行政管理人员、警察、保安、保洁等。**

**防护建议：**戴医用外科口罩。

**（二）在新型冠状病毒肺炎确诊病例、疑似病例患者的病房、ICU 工作的人员；指定医疗机构发热门诊的医务人员；中、高风险地区医疗机构急诊科的医务人员；流行病学调查、实验室检测、环境消毒人员；转运确诊和疑似病例人员。**

**防护建议：**戴医用防护口罩。

**（三）从事呼吸道标本采集的操作人员；进行新型冠状**

病毒肺炎患者气管切开、气管插管、气管镜检查、吸痰、心肺复苏操作，或肺移植手术、病理解剖的工作人员。

防护建议：头罩式（或全面型）动力送风过滤式呼吸防护器，或半面型动力送风过滤式呼吸防护器加戴护目镜或全面屏；两种呼吸防护器均需选用 P100 防颗粒物过滤元件，过滤元件不可重复使用，防护器具消毒后使用。

## 五、使用注意事项

（一）呼吸防护用品包括口罩和面具，佩戴前、脱除后应洗手。

（二）佩戴口罩时注意正反和上下，口罩应遮盖口鼻，调整鼻夹至贴合面部。

（三）佩戴过程中避免用手触摸口罩内外侧，应通过摘取两端线绳脱去口罩。

（四）佩戴多个口罩不能有效增加防护效果，反而增加呼吸阻力，并可能破坏密合性。

（五）各种对口罩的清洗、消毒等措施均无证据证明其有效性。

（六）一次性使用医用口罩和医用外科口罩均为限次使用，累计使用不超过 8 小时。职业暴露人员使用口罩不超过 4 小时，不可重复使用。